

Mental Health Services



FACULTY OF HEALTH SCIENCES
UNIVERSITY OF COPENHAGEN

The CHANGE-Trial

A randomised clinical trial investigating the effect of care coordination and lifestyle counselling in patients with schizophrenia

Helene Speyer, MD PhD-student (helene.speyer@regionh.dk)


Odense 2015

Mit brændende ønske:

At unge med psykose **har samme
forventede levetid, og de samme
forventninger til livet**, som deres
jævnaldrende

Forskelle i forventet livslængde sammenlignet med baggrundsbefolkningen, mænd

■ Denmark ■ Finland ■ Sweden






Mental Health
Service

Forventet livslængde for mænd med skizofreni i Danmark sammenlignet med den forventede livslængde i andre lande i verden


Mænd med skizofreni i DK: 55,7 år



Reference : [http://en.wikipedia.org/wiki/
List of countries by life expectancy](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy)

På niveau med Tanzania, Kenya, Etiopien og Sudan

Mortality from cardiovascular disease (men)




Schizophrenia

Background


Laursen og
Nordentoft,
PsychResearch
2011

Mortality from cardiovascular disease (men)




"The biggest health scandale of our time"


Professor Sue Bailey




Background

Laursen og
Nordentoft,
PsychResearch
2011






Psychotic Disorders: a Systematic Critical Reappraisal



(a) Overall mortality as hazard ratios in the chronic patient population (N = 21492) compared with mortality in the control sample.



Minna Torniainen et al. Schizophr Bull 2014;schbul.sbu164

**Schizophrenia
Bulletin**

Hvad kan vi gøre

- Er vi gode nok til at vælge AP?
- Er vi gode nok til at trappe medicinen ned?

24 hour recall



Livsstil

- Hvordan skabes forandring hos psykisk syge?
- Hvordan fastholdes forandring?
- Kan vi forbedre rammerne?

Somatisk underbehandling

- Psykisk syge får en dårligere behandling
- Hvem tager ansvaret?



Flow chart CHANGE

429 participants

Treatment
as usual

Care
coordination

CHANGE

1 and 2 years follow up

Primary outcome: 10 years risk of CVD

Secondary outcomes: cardiorespiratory fitness, negative symptoms and cognition

Method

Standard treatment

- Årlig monitorering
- Henvisning til egen læge

The care coordination as add on

- Tilknytning til care coordinator
- Caseload 1:40
- Sikre somatisk udredning og behandling

The CHANGE intervention as add on

- Tilknytning til coach
- Caseload 1:12
- Motivational interviewing
- Stages of change
- Hjemmebesøg
- 4 manuals:
 - Care coordination
 - Rygestop
 - Fysisk aktivitet
 - Kost

There is a crack, a crack in everything

- that's how the light gets in



Anthem, L. Cohen



Tak for opmærksomheden

The capital region

Merete Nordentoft

Jesper Krogh

Hans Christian Nørregård

Ane Storch Jakobsen

Henrik Lublin

Charlotta Pisinger

Thomas Axel Madsen

Mette Karlsen

University of Copenhagen

Peter Krstrup

Oluf Borby Pedersen

University of Århus

Mogens Vestergaard

Ole Mors

Søren Drivsholm

Merete Birk Jespersen

Funding

Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse

Region Hovedstadens
Forskningsfond og Region
Hovedstadens Psykiatri

TrygFonden

LundbeckFonden

Randi Dæhnfeldts Fond