

Overblik over AGREE-II vurderinger af retningslinjer for NKR øvre dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Reference	Samlede vurdering	Rigour vurdering (Domæne 3) Gennemsnit for 2 bedømmere	Anvendes i NKR?
Canadian Best Practice Recommendations for Stroke Care (Update 2013). (Ref ID: 5608)	Inkluderer dysfagi, ingen estimater, GRADE ikke anvendt. Nogle recommendationer synes ikke klart relateret til underliggende evidens. Kan ikke bruges direkte; Referencer kan evt bruges.	4,8	nej
National stroke foundation. Clinical guidelines for stroke management, Australia (Ref ID: 5577)	Inkluderer dysfagi, ingen estimater, GRADE ikke anvendt. Nogle recommendationer synes ikke klart relateret til underliggende evidens. Kan ikke bruges direkte; Referencer kan evt bruges.	5,5*	nej
Management of Stroke Rehabilitation Working Group VA/DoD clinical practice guideline for the management of stroke rehabilitation (Ref ID: 5602)	Inkluderer dysfagi, ingen estimater, GRADE ikke anvendt. Nogle recommendationer synes ikke klart relateret til underliggende evidens. Kan ikke bruges direkte; Referencer kan evt bruges.	4,5*	nej
National Institute for Clinical Excellence (NICE) Stroke rehabilitation : Long-term rehabilitation after stroke (Ref ID: 11)	Inkluderer dysfagi, Men ikke relevante interventioner. Estimer og GRADE anvendt. Kan ikke bruges	6,9*	nej
Network Management of patients with stroke: identification and management of dysphagia : A national clinical guideline (SIGN 119) (Ref ID: 8)	Metodologisk uklar; ingen estimater, GRADE ikke anvendt. Nogle recommendationer synes ikke klart relateret til underliggende evidens. Kan ikke bruges direkte; Referencer kan evt bruges.	3,3	nej
SIGN Scottish Intercollegiate, Guidelines Network. Brain injury rehabilitation in adults : national clinical guideline (SIGN 130) (Ref ID: 198)	Inkluderer dysfagi, ingen estimater, GRADE ikke anvendt. Nogle recommendationer synes ikke klart relateret til underliggende evidens. Kan ikke bruges direkte; Referencer kan evt bruges.	4,6*	nej

DGEM Steering Committee* Guideline clinical nutrition in patients with stroke. Inkluderer dysfagi, ingen estimer, GRADE ikke anvendt. Nogle recommendationer synes ikke klart relateret til Experimental & translational stroke medicine underliggende evidens. Kan ikke bruges direkte; Referencer kan evt bruges.

5,3

nej

Note: * Vurdering trukket fra NKR: Erhvervet