

Mange nyfødte er gule – nogle er det for længe



Gulsot efter 14. levedøgn kan være tegn på alvorlig sygdom, fx galdevejsatresi. Derfor skal du reagere på det som praktiserende læge, også selv om barnet er i god trivsel og ikke har andre tegn på sygdom.

Læs mere på stps.dk/gulsot

Synlig gulsot hos nyfødt

< 24 timer

Henvis akut til pædiatrisk afdeling

1.-14. levedøgn

Henvis til måling af **transkutan bilirubin og/eller total serum bilirubin på sygehus**, hvis den nyfødte udover at have gulsot er sløv, ikke melder sig til måltider, ikke har tilstrækkelig vandladning eller afføring, og/eller afføring er lys.

> 14 levedøgn for mature børn eller > 21 levedøgn for præmature børn = forlænget gulsot

Mål **altid og uden forsinkelse** (senest førstkommande hverdag) fraktioneret bilirubin

Konjugeret bilirubin > 17 µmol/l

Kan være tegn på galdevejsatresi. Henvis **senest næste dag** til pædiatrisk afdeling

Konsekvenser ved for sen opsporing af galdevejsatresi

- Varig leverskade
- Risiko for levertransplantation
- Ubehandlet er galdevejsatresi dødelig